

- ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
- NP'Lİ KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

| Garanti Edilen İçerik | w/w |
|---|--------|
| ■ Toplam Organik Madde | % 25 |
| ■ Toplam Azot (N) | % 8 |
| ■ Amonyum Azotu (NH ₄ -N) | % 5,9 |
| ■ Üre Azotu (NH ₂ -N) | % 2,1 |
| ■ Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅) | % 21 |
| ■ Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅) | % 17 |
| ■ Toplam Kükürt Trioksit (SO ₃) | % 15 |
| ■ Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃) | % 0,01 |
| ■ Toplam Humik+Fulvik Asit | % 5 |
| ■ Max Klor (Cl) | % 0,5 |
| ■ Max Nem | % 20 |
| ■ pH | 6-8 |



KULLANIM ALANLARI VE DOZAJLARI

| Bitkiler | Uygulama Zamanı | Dozaj - Tabandan |
|--|---------------------------------------|------------------|
| Bağ | Gözler uyanmadan önce | 30-40 kg / da |
| Sert Çekirdekli Meyveler (Kayısı, Erik vb.) | Gözler uyanmadan önce | 20-40 kg / da |
| Endüstriyel Ürünler (Mısır, Pamuk, Ayçiçeği vb.) | Ekim-dikimden önce | 40-60 kg / da |
| Yumuşak Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut vb.) | Gözler uyanmadan önce | 20-40 kg / da |
| Turuncgiller | Gözler uyanmadan önce | 25-45 kg / da |
| Açık Tarla Sebzeleri (Domates, Biber vb.) | Ekim-dikimden önce veya üst gübreleme | 30-40 kg / da |
| Fındık | Gözler uyanmadan önce | 30-60 kg / da |
| Kivi | Gözler uyanmadan önce | 25-40 kg / da |
| Kavun, Karpuz | Ekim-dikimden önce veya üst gübreleme | 25-40 kg / da |
| Kesme Çiçekçilik | Bitkilerin gelişimi boyunca | 10-15 kg / da |